

## Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)

### Taxonomi

**Artsnavn (latinsk navn):** Corydoras similis

**Populærnavn (dansk navn):**

**Familie (latin):** Callichthyidae

**Type:** Maller, Pansermaller

**Opdager (beskrevet af):** Hieronimus, 1991

**Førstegangs opdræt i DK:**

### Levested

**Verdensdel:** Sydamerika.

**Biotop (beskrivelse af regionen):** Regnskovsbiotop med lavt vand og masser af gemmesteder i form af fx grene og trærodde.

### Udseende

**Størrelse:** 6 cm.

**Form:** Solid, kantet krop med stort hoved med nedadrettet mund. Rygfinne og brystfinner er trekantede med stive finnestråler til forsvar mod rovdyr. Halefinnen er kløvet.

**Farve:** Se billeder

**Kønsforskel:** Hunnen er større og mere buttet.

**Varianter:**

### Behov

**Dekorationer:** Bund af sand eller afrundet grus, så fisken ikke ødelægger sine føletråde, når den roder efter mad. Lidt skjul i form af plantetykninger, trærodde o.lign.

**Adfærd:** Fredelig fisk, som er velegnet til såvel selskabsakvarier som biotopakvarier. Kan holdes stort set sammen med alle fisk, bortset fra større, aggressive cichlider, som gør krav på bundarealet som deres territorium.

**Social:** Trives bedst i flokke på fem eller derover. Pansermaller stimer uanset om de tilhører samme art eller ej.

**Foder:** Alt, som synker til bunds. Pellets, mallerpiller, frostfoder, rejer og tubifex.

### Vandet

**Akvariestørrelse:** 50

**Niveau:** Bund zone

**Vandcirkulation:** Middel

**Min. pH:** 5,5

**Max. pH:** 7,5

**Min. dH:** 5

**Max. dH:** 15

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:** Medium

### **Formering**

**Ynglebiologi:** Hæfteleger uden yngelpleje. En mindre flok med dobbelt så mange hanner som hunner placeres i et mindre akvarium, hvor de fodres grundigt op, og hvor vandplejen er god. Leg triggeres af et koldt vandskift.

**Drægtighed:** Æggene klækker efter to dage, ungerne er fritsvømmende efter yderligere fire dage.

**Leg:** Legen foregår i den klassiske t-stilling, som er typisk for Corydoras. De moderat klæbrige æg hæftes fast overalt i akvariet. Efter legen efterstræber forældrene kun deres æg i ringe grad, men det er bedst at flytte dem tilbage til opholdsakvariet. Methylenblåt eller lignende kan tilsættes for at forebygge skimmel.

**Øvrigt omkring opdræt og yngel:** Ynglen vokser relativt hurtigt, og opfodres effektivt på f.eks. nyklækket og afskallet artemia.

### **Øvrige oplysninger**

#### **Generel beskrivelse**

**Forfatter:** Elisabeth Schrøder



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)