

**Denne side er udskrevet fra [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)**

**Taxonomi**

**Artsnavn (latinsk navn):** Chuco godmanni

**Populærnavn (dansk navn):**

**Familie (latin):**

**Type:** Cichlider, Central Amerika

**Opdager (beskrevet af):** Günther, 1862

**Førstegangsoptøret i DK:**

**Levested**

**Verdensdel:**

**Biotop (beskrivelse af regionen):**

**Udseende**

**Størrelse:**

**Form:**

**Farve:** Den cichlide kan have en vinkelformet sort aftegning. Se billede for farver.

**Kønsforskelle:**

**Varianter:**

**Behov**

**Dekorationer:**

**Adfærd:**

**Social:**

**Foder:** Alger, Artemia, Cichlidesticks, Cyclops, Daphnier, Flagefoder, Levende føde, Myggelarver (Hvide), Myggelarver (Røde), Myggelarver (Sorte), Rejemix, Spirulinaflager, Tubifix

**Vandet**

**Akvariestørrelse:** 530

**Niveau:**

**Vandcirkulation:**

**Min. pH:** 7

**Max. pH:** 8

**Min. dH:**

**Max. dH:**

**Min Temperatur:**

**Max Temperatur:**

**Belysning:**

**Formering**

**Ynglebiologi:**

**Drægtighed:**

**Leg:**

Chuco godmanni er en monogam pardannende substratleger. Som typiske substratlegere, finder de et område i akvariet, som de rengører. Begge par hjælpes ad. Dog er det ofte hunnen, der primært står for arbejdet. Typisk vælges en flad sten. Her lægges æggene, og begge forældre passer på dem. Det er ikke unormalt, at især hannen kan finde på at æde æggene ved de første forsøg. Når æggene efter en ½ til 1 uge klækker, så flyttes ungerne ofte. I starten lever ungerne af deres blommesæk. Herefter kan de fodres med småt foder som f.eks. nyklækket eller afskallet artemia. Når ungerne er fritsvømmende efter 10-14 dage, følger forældrene dem rundt i akvariet. Her kan de andre fisk i akvariet få nogle gevaldige stryg, hvis de kommer for tæt på, hvorfor de bør være flyttet inden. Hvis der forsvinder en del unger undervejs, så er det ikke unormalt at der forekommer lidt kannibalisme.

**Øvrigt omkring  
opdræt og yngel:**

**Øvrige oplysninger**

**Generel  
beskrivelse**

Chuco godmanni foretrækker de lidt mere hurtigt flydende floder, og man finder dem især der, hvor det koldere vand kommer ned fra bjergene. Her lever de enten solitært eller parvis. Cichliden findes i landene Guatemala og Belize.

Denne altædende fisk, har specialiseret sig i friske planter. Derfor er det unødvendigt at skrive, hvilke konsekvenser det evt. kan have for dit planterakvarium! Fisken spiser også små insekter, men det er vigtigt, at fisken har adgang til grøn kost. Prøv at supplere med grøntsager som f.eks. salatblade.

Denne store cichlide kan være ret aggressiv over for sine artsfæller, og den holdes bedst parvis, i et akvarium med gemmesteder i form af f.eks. rødder og sten. Man kan muligvis have succes med andre ikke-Chuco arter sammen med den, men når der kommer æg, så kan det være nødvendigt at isolere de andre fisk.

**Forfatter:**

Karl-Henrik Arendt Korrektur, Laura 2013

---



Få flere informationer på [www.akvariefisk.dk](http://www.akvariefisk.dk)